


Myyntipäällyksen teksti

KORRENSÄÄDE 5 C LIMIT**Kasvunsäade**

Haitallinen

Tehoaine: klormekvattikloridi 460 g/l**Valmistetyyppi:** SL**Käyttötarkoitus:**

Viljojen kasvun säätelyyn ja lakoutumisen estämiseen sekä koristekasvien kasvun säätelyyn. Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Varoitukset:

Terveydelle haitallista nieltynä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

Käytön rajoitukset:

Syysviljat on ruiskutettava ennen kesäkuun alkua ja kevätiljat ennen heinäkuun alkua (yleensä 25.6. mennessä). Viljan olkia ei saa käyttää lypsykarjan rehuksi. Syöttö lihakarjalle on lopetettava viikkoa ennen teurastusta.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suoja-pukua, kumisaappaita, päähinettä ja kemikaalinkestäviä käsineitä (esim. nitrili). Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen/silmien suojainta.

Käyttöohje:**Viljat**

Viljat voidaan ruiskuttaa joko yhdessä rikkakasvihävitteen kanssa ennen viljan korrenkasvun alkua tai yksinään viimeistään viljan 1-solmuasteella. Paras laonesto-vaikutus saadaan ruiskutettaessa 1-solmuasteella. Rukiin ja kauran käsittelyssä ruiskutusnesteeseen voidaan lisätä kostutusainetta 0,3 - 0,5 l/ha, mikäli valmistetta ei ruiskuteta seoksena jonkun muun aineen kanssa.

<u>Käyttökohde</u>	<u>Käyttömäärä l/ha</u>
syysvehnä	1,5 - 3,3
kevävehnä	0,5 - 1,5
ruis	2,5 - 3,3
kaura	1,5 - 2,5

Vesimäärä 200 - 400 l/ha.

Huomautukset:

Vaarallista muille viljelykasveille. Heikossa kasvukunnossa olevaa tai poudanaralla maalla kasvavaa viljaa ei saa ruiskuttaa.

Koristekasvien kasvun säätely

<u>Käyttökohde</u>	<u>Käsittelykertojen lukumäärä ensimmäisen käsittelyn ajan-kohta *)</u>	<u>Käyttömäärä valmistetta ml/100 l vettä</u>
<u>Käyttö ruiskutteena</u>		
Abutilon x hybridum (vaahtera-aulio)	1 kerta, kasvien ollessa n. 10 cm	155 - 260
Aphela'ndra squarrosa (leopoldinkukka)	1 kerta, kasvin ollessa 10-15 cm	390 - 490
Begonia x cheima'ntha (annansilmä)	1 kerta, versonnan alettua latvonnan jälkeen	155 - 195
Begonia x hiema'lis (pauliinabegonia)	2-4 kertaa lajikkeesta ja vuodenaajasta riippuen, 1. kerta heti lyhytpäiväkäsittelyn alkaessa	155 - 195
Begonia tuberhybrida (mukulabegonia)	1 kerta taimien ollessa n. 10 cm	155 - 195
Calceolaria x specio'sa	2 kertaa, 1. kerta kukkanappujen ollessa	90

(iso tohvelikukka)	1-2 mm	
Cataranthus roseus (punatalvio)	1 kerta, latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	195 - 260
Clerodendrum thomsoriae (kohtalonpensas)	1-2 kertaa, 1. kerta heti latvonnan jälkeen	195 - 300
Euphorbia pulche'rrima (joulutähti)	8-10 kertaa, 1. kerta latvomattomille taimille viikko istutuksen jälkeen, latvotuille 2 viikkoa lat- vonnan jälkeen. Kasvun ollessa voimakas uusinta- käsittelyt 2 kertaa vii- kossa. Viimeinen pituus- kasvun hillitsemiseksi tehty käsittely ennen 15.10.	390
- " -	Suojuslehtien alkaessa värittyä, "tähden" laadun parantamiseksi	195 - 260
Fuchsia x hybridum (verenpisara)	2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 3-4 cm	300 - 390
Hibiscus spp. (kiinanruusu)	2 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 3-4 cm	155 - 260
Pachystachus lutea (kultakäpy)	3-4 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	155 - 195
Pelargonium hortorum (kotipielikki)	1-2 kertaa, 1. kerta 2 viikkoa latvonnan jälkeen	260 - 300
Pelargonium peltatum (riippapielikki)	1-2 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 10-12 cm	260 - 300
Pelargonium domesticum (jalopielikki)	2-3 kertaa, 1. kerta latvomattomille taimille	390 - 490
Rosa (äitienpäiväruusu)	2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen ver-	490

	sojen ollessa 3-4 cm, käsittelyväli 8 vrk	
Sinningia speciosa (suppilokukka)	2-3 kertaa, 1. kerta lehtien ollessa 10-12 cm pitkiä	195 - 300
Dianthus caryophyllus (neilikka)	2 kertaa, 1. kerta lyhytpäiväkäsittelyn alkaessa, uusinta 2 viikkoa myöhemmin	815 - 980
Chrysanthemum frutescens (margareeta)	2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	390 - 490
<u>Käyttö kasteluna</u>	<u>1. kerta</u>	
Achimenes x hybrida (torpankukka)	Taimien ollessa 5-8 cm	300 - 490
Aphelandra squarrosa (leopoldinkukka)	Taimien ollessa 10 - 15 cm	600 - 730
Pelargonium x hortorum (kotipielikki)	2 viikkoa latvonnan jälkeen	490
Euphorbia fulgens (koralliköynnös)	1. kerta versojen ollessa 20-30 cm	195 - 300
Chrysanthemum frutescens (margareeta)	Latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	980 - 1470

*) Uusintakäsittely, ellei toisin ole mainittu, 2-3 viikon välein.

Huomautukset:

Käsittelyn jälkeen voi esiintyä ohimenevää kloroosia. Suuremmat käyttömäärät voivat aiheuttaa vioituksia. Vastaistutettuja neilikan taimia saa käsitellä aikaisintaan 10 päivän kuluttua latvomisesta ja pitkän päivän käsittelyssä olevia aikaisintaan 3 viikon kuluttua valotuksen aloittamisesta.

Luvanhaltija: xxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxx

Edustaja Suomessa: xxx

Rekisterinumero: 1882

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: XXXXXX

Nettotilavuus: 0000

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 27.11.2000.