

Myyntipäällyksen teksti

CONFIDOR WG 70

Tuhoeläinten torjuntaan

Varoitus



Haitallista nieltynä.

Skadligt vid förtäring.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Förvaras oåtkomligt för barn.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

Valumat on kerättävä.

Samla upp spill.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: imidaklopridi 700 g/kg

Valmistetyyppi: WG

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Kirvojen, jauhiaisten ja ripsiäisten torjuntaan, kurkusta, tomaatista, paprikasta ja koristekasveista kasvihuoneessa.

Käytön rajoitukset:

Varoaika 1 vrk kurkulla, tomaatilla ja paprikalla käytettäessä kastelukäsittelyä. Varoaika 3 vrk kurkulla, tomaatilla ja paprikalla käytettäessä ruiskutus käsittelyä. Ruiskutettuna haitallista kasvihuonetuholaisten biologisille torjuntaeliöille, jolloin varoaika useimmille biologisille torjuntaeliöille on 2-4 viikkoa.

Resistenssin hallinta:

Resistenssin ehkäisemiseksi on tärkeää, että valmistetta käytetään käyttöohjeen mukaisesti (käyttömäärä, -kerrat ja -ajankohta) minimoimalla käyttökertojen määrä. Vaikutusmekanismiltaan samanlaisia valmisteita ei pidä käyttää useita kertoja peräkkäin, vaan valita valmiste toisesta tehoaineryhmästä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella.

Vesieläimien suojelemiseksi on varmistauduttava, ettei ainetta joudu viemäriverkostoon.

Valmiste on myrkyllistä hyötyniveljalkaisille, joten se ei sovellu käytettäväksi yhtä aikaa biologisen torjunnan kanssa.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjä, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Mikäli Confidor WG 70 -valmisteella käsiteltyä kasvualustaa myydään uudelleen käyttöä varten, tulee kasvinsuojeluainekäsittelystä ilmoittaa ostajalle.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

Käyttöohje:

Valmistetta käytetään ruiskutteena tai kastelujärjestelmän kautta annosteltuna. Käsittely tulee tehdä tuholaisaastunnan alkuvaiheessa.

Käyttömäärät:*Kurkku, tomaatti ja paprika*

Ruiskutus-käsittely: 0,014 % liuoksella (14 g/100 l vettä) vesimäärällä 1000-1500 l/ha (100-150 l/1000 m²), jolloin käyttömäärä 0,14 -0,21 kg/ha). Ruiskutus suoritetaan kahdesti kasvuasteella 10-81. Ruiskutusväli vähintään 14 vrk.

Kastelukäsittely:

0,0035 % -0,014 % liuoksella (3,5 -14 g/100 l vettä)/1000 tainta kasvuasteella 10-89.

Enimmäiskäyttömäärä/käsittely kurkulla 0,21 kg/ha, paprikalla 0,45 kg/ha ja tomaatilla 0,35 kg/ha. Valmistetta voidaan käyttää enintään 2 kertaa kasvukauden aikana.

Käsittelyväli on oltava vähintään 7 vrk.

Käytettäessä valmistetta kastelujärjestelmän kautta on varmistettava, että valmistetta sisältävä kasteluneste kuluu mahdollisimman tarkkaan pois ennen kuin järjestelmään lisätään uutta kasteluvettä.

Koristekasvit

Ruiskutus-käsittely: 0,01 % liuos (10 g/100 l vettä) vesimäärällä 500-1000 l/ha (50-100 l/1000 m²), mikä vastaa 5-10 g Confidor WG 70/1000 m². Valmistetta voidaan käyttää enintään 2 kertaa viljelykauden aikana. Käsittelyväli 10-14 vrk.

Kastelukäsittely: 0,0035 % -0,014 % liuos (3,5 -14 g/100 l vettä)/1000 tainta kasvuasteella 10-60. Liuosta kuluu noin 70 ml/halkaisijaltaan 12-14 cm ruukku. Valmistetta voidaan käyttää enintään 2 kertaa viljelykauden aikana. Käsittelyväli 10-14 vrk.

Ruiskutettaessa on käytettävä riittävää vesimäärää ja ruiskutuspainetta, jotta kasvit tulevat kauttaaltaan käsitellyiksi. Kasveja ei kuitenkaan saa ruiskuttaa tippuvan märiksi. Kastelujärjestelmän kautta käytettäessä voidaan tehoa nopeuttaa, jos kasvualusta saa hieman kuivahtaa ennen käsittelyn aloittamista. Kasvinsuojeluainetta sisältävä kasteluliuos tunkeutuu silloin nopeammin kasvien juurien ulottuville.

Valmisteen vaikutus alkaa näkyä muutamassa vuorokaudessa ja se kestää 1-4 viikkoa.

Huomautukset:

Valmiste tehoa kaikkiin tuhohyönteisten aktiivisiin kehitysvaiheisiin, mm. hyönteisten imeviin kehitystasteisiin, joihin se vaikuttaa kosketuksen ja suoliston kautta. Valmiste vaikuttaa pääasiassa systeemisesti ja sen vaikutus tulee näkyviin nopeasti. Tehoa myös aineen kanssa kosketuksiin joutuneisiin tuhohyönteisten muniin.

Tuhohyönteisten kestävyys voi vaihdella, jonka vuoksi torjuntaohjelmassa suositellaan käytettäväksi myös muita tehoaineita sisältäviä valmisteita. Etenkin kalifornianripsiaisen kestävyys valmistetta kohtaan vaihtelee.

Kasveja ei saa ruiskuttaa kirkaassa auringonpaisteessa. Tehoa hyvin 15-30 °C:n lämpötilassa, kun kasvien elintoiminnot ovat vilkkaat.

Kasvihuone on tuuletettava huolellisesti ruiskutuskäsittelyn jälkeen. Kasvuston annetaan kuivua täysin, ennen kuin aloitetaan työskentely käsitellyssä kasvustossa. Kasvinsuojeluaineella käsitellyn tilaan saa mennä ilman edellä esitettyjä suojaimia seuraavana päivänä kasvinsuojeluainekäsittelyn jälkeen. Valmistetta kastelujärjestelmän kautta käytettäessä kasvihuoneessa voidaan työskennellä normaalisti.

Kastelujärjestelmän kautta käytettynä valmiste on haitatonta useimmille torjuntaeliöille, mutta haitallista *Orius* - ja *Macrolophus* -petoluteille sekä kasvualustassa eläville *Hypoaspis* -petopunkeille.

Suurin osa koristekasveista kestää valmistetta hyvin. Kasvien suuresta laji- ja lajikevalikoimasta johtuen on kuitenkin syytä tehdä koe ennen varsinaista käyttöä kasvien kestävyden toteamiseksi.

Varastoitava kuivassa ja viileässä paikassa.

Luvanhaltija: XXX

Edustaja Suomessa: XXX

Valmistaja ja pakkaaja: XXX

Rekisterinumero: 1906

Netttilavuus: 000

Valmistuserä: 000

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 18.3.2015.