


**SENKOR SC 600****Minor use käyttöohje****Rikkakasvien torjuntaan****Varoitus**

Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkar hjälp.

Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Senkor SC 600 –valmisteen käytön (minor use, aik. off-label) käyttökohteet ja –ohjeet vähäisiin käyttötarkoituksiin.

**Virallisesti tarkastettujen käyttökohteiden lisäksi valmisteen käyttö on sallittu käyttäjän vastuulla seuraavilla kasveilla:**

Rikkakasvien torjuntaan kuminalta kylvövuonna.

**Tehoaine:** metributsiini 600 g/l

**Valmistetyyppi:** SC

**Käyttäjärühmä:** Ammattikäyttäjät

**Tuotevastuu ja vastuu käytöstä:**

Käyttöohjeen taustalla ei ole vastaavan laajuisia tehokkuustestejä kuin varsinaisessa rekisteröinnissä. Monet tekijät, kuten sää, kasvualusta, lajike, resistenssi, ruiskutustekniikka ja muu käyttötapa voivat vaikuttaa tuotteen tehoon tai vaikutuksiin kasvustossa. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ei vastaa tuotteen väärästä tai käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK

ry ei myöskään vastaa käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista tai tulon-, ansion- tai muista vastaavista menetyksistä. Käänny viljelyneuvojan tai aineen toimittajan puoleen, jos sinulla on kysymyksiä aineen käytöstä.

**Huomaa! Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista valmisteen käytössä käyttökohteissa, joita minor use (aik. off-label) -hyväksyntä koskee. Valmistaja Bayer A/S Bayer CropScience vastaa, että oikein varastoitu, alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista.**

#### **Resistenssin hallinta:**

Valmisteen sisältämä tehoaine kuuluu HRAC-ryhmään C1 (triatsonit). Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla lohkollla useana peräkkäisenä vuonna.

#### **Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialuekat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojaväyhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine vietään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

#### **Suojainohjeet:**

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

#### **Käyttöohje:**

##### **Kylvövuoden keväällä ennen kuminan taimettumista:**

Rikkakasvien torjuntaan keväällä 2 – 3 vrk ennen kuminan taimettumista. Senkor SC 600:n käyttömäärä on 0,25 – 0,30 l/ha maalajista ja maan kosteudesta riippuen. Vesimäärä on 200 l/ha. Alhaisinta määrää käytetään kevyillä kivennäismailla. Tehon parantamiseksi ja laajentamiseksi suositellaan valmistetta käytettäväksi ohjelmassa yhdessä Fenix-valmisteen kanssa.

#### **Huomautuksia:**

Vaarallinen muille viljelyskasveille. Vaikuttaa leveälehtisiin rikkoihin hieta- ja savimailla lehtien ja maan kautta, eloperäisillä mailla etupäässä lehtien kautta.

Valmisteen teho leveälehtisiin siemenrikkoihin ja kylänurmikkaan on hyvä, peippeihin ja tatarlajeihin tyydyttävä. Teho mataraan on riittämätön, kiertotattareeseen ja ohdakkeeseen teho on heikko.

Paras torjuntatulos saavutetaan lämpimällä säällä ruiskutettaessa, maan ollessa kostea. Kuivalla säällä teho on paras ruiskutettaessa aamulla, ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea. Ruiskutusta yli +25 °C lämpötiloissa tulisi vioitusriskin vuoksi välttää, jos viljelykasvi on saavuttanut taimiasteen.

Normaaleihin ruiskutusolosuhteisiin suositellaan viuhkasuuttimien käyttöä.

Tarpeen vaatiessa, esim. tuulen ollessa kohtalainen, voidaan käyttää vastaavia ilma-avusteisia suuttimia.

Säilytetään viileässä mutta jäätymiseltä suojatussa tilassa.

**Luvanhaltija:** xxx

**Valmistaja ja pakkaaja:** xxx

**Edustaja Suomessa:** xxx

**Rekisterinumero:** 3084

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** 0000

**Nettopaino tai -tilavuus:** 00

**Vähäiset käyttötarkoitukset (minor-use) -hyväksymisen haltija:**

MTK ry, Simonkatu 6, 00100 Helsinki

Yhteyshenkilö: Mika Virtanen

puh. 020 413 2468, s-posti: etunimi.sukunimi@mtk.fi

Minor use -hyväksyminen on voimassa 30.9.2018 saakka.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 16.4.2014.