

## Myyntipäällyksen teksti

## SIGNUM

## Kasvitautilien torjuntaan

## Varoitus



Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
Valumat on kerättävä. Samla upp spill.  
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.  
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Signum –valmisteen käytön (minor use, aik. off-label) käyttökohteet ja –ohjeet vähäisiin käyttötarkoituksiin.

**Virallisesti tarkastettujen käyttökohteiden lisäksi valmisteen käyttö on sallittu käyttäjän vastuulla seuraavilla kasveilla:**

Sienitautien torjuntaan seuraavilla kasveilla:

- Tomaatti, paprikat (myös maustepaprikat) ja munakoiso kasvihuoneessa
- Kasvihuonekurkku, avomaankurkku ja kesäkurpitsa kasvihuoneessa
- Salaattikasvit (*Lactuca*-suku, siloendiivi, vuonankaali, sinappikaali (rukola ja villirukola), vihanneskrassi, *Brassica*-suvun lehdet ja idut, mizuna eli japaninkaali, herneen ja retiisin ja muiden pienilehtisten *Brassica*-lajien lehdet (korjattu enintään 8-lehtisinä, babyleaf)) ja pinaatti kasvihuoneessa ja avomaalla
- Yrtit (kirveli, ruohosipuli, yrttiselleri, fenkolin lehdet, korianterin lehdet, tillin lehdet, kuminan lehdet, liperin lehdet, väinönputki, saksankirveli ja muut Apiaceae-heimon yrtit, persilja, salvia, rosmariini, timjami, meirami, oregano, basilika, sitruunamelissa, minttu, piparminttu, laakerinlehti, rakuuna ja iisoppi) kasvihuoneessa ja avomaalla
- Retiisit ja retikat kasvihuoneessa
- Palsternakka, juuripersilja, punajuuri, mukulaselleri, piparjuuri, retiisit ja retikat sekä kaurajuuri avomaalla
- Valkosipuli, salottisipuli ja varhaissipulit (pillisipuli, salaattisipuli ja vastaavat lajikkeet) avomaalla
- Parsakaali, kukkakaali, valkokaali, ruusukaali, punakaali, savoijinkaali, suippokaali ja lehtikaali avomaalla
- Kuivattavat pavut avomaalla
- Tilli avomaalla
- Peruna avomaalla (vain lehtipoltteen torjuntaan)
- Mansikka kasvihuoneessa
- Pensasmustikka avomaalla
- Vadelmat ja vatukat (vadelma, karhunvatukka, loganinmarja, boysenmarja, lakka, japaninvadelma, mesimarja ja mesivadelma) avomaalla, muovitunnelissa tai kasvihuoneessa
- Herukat (puna-, musta-, viher- ja valkoherukka) avomaalla
- Koristekasvit kasvihuoneessa ja avomaalla

**Tehoaineet:** boskalidi 267 g/kg  
pyraklostrobiini 67 g/kg

**Valmistetyyppi:** WG

**Käyttäjryhmä:** Ammattikäyttäjät

**Tuotevastuu ja vastuu käytöstä:**

**Käyttöohjeen taustalla ei ole vastaavan laajuisia tehokkuustestejä kuin varsinaisessa rekisteröinnissä. Monet tekijät, kuten sää, kasvualusta, lajike, resistenssi, ruiskutustekniikka ja muu käytötapa voivat vaikuttaa tuotteen tehoon tai vaikutuksiin kasvustossa. Kauppapuutarhaliitto ry, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry, Taimistoviljelijät ry ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ei vastaa tuotteen väärästä tai käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. Kauppapuutarhaliitto ry, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry, Taimistoviljelijät ry ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ei myöskään vastaa käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista tai tulon-, ansion- tai muista vastaavista menetyksistä. Käänny viljelyneuvojan tai aineen toimittajan puoleen, jos sinulla on kysymyksiä aineen käytöstä.**

**Huomaa! Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista Signum- valmisteen käytössä käyttökohteissa, joita minor use (aik. off-label) -hyväksyntä koskee. Valmistaja BASF Oy vastaa, että oikein varastoitu, alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista.**

**Käytön rajoitukset:**

Tomaatti, paprikat, munakoiso: 3 vrk  
Kasvihuonekurkku, avomaakurkku, kesäkurpitsa: 1 vrk  
Salaattikasvit, pinaatti, yrtit: 14 vrk  
Juurekset ja juurimukulat (retiisi, retikka, japaninretikka, palsternakka, juuripersilja, punajuuri, mukulaselleri, piparjuuri, kaurajuuri): 14 vrk  
Sipulit: 14 vrk  
Kaalit: 14 vrk  
Kuivattavat pavut: 21 vrk  
Tilli: 14 vrk  
Peruna: 3 vrk  
Mansikka: 3 vrk  
Pensasmustikka: 3 vrk  
Herukat: 3 vrk  
Vadelmat ja vatukat: 3 vrk

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin <sup>1)</sup>		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys

salaattikasvit, pinaatti, yrtit, juurekset ja juurimukulat, sipulit, kaalit, pavut, tilli, peruna	Ei sallittu	15 m	10 m	3 m
pensasmustikka, vadelmat ja vatukat, herukat, koristekasvit	Ei sallittu	50 m	40 m	30 m

1)Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta [www.tukes.fi/vesistorajoitus](http://www.tukes.fi/vesistorajoitus). Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Maaperän eliöiden suojelemiseksi tätä tai mitä tahansa muuta valmistetta, joka sisältää boskalidia, ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla kasvulohkolla.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

#### Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

#### Käyttöohje:

Valmistetta käytetään kasvitautien torjuntaan ruiskutuksena. Signumilla on vaikutus laajaan kirjoon sienitauteja ja lehtilaikkutauteja, kuten harmaahomeet sekä *Alternaria*- ja *Sclerotinia*-sienet.

Ensimmäinen käsittely tehdään taudin aikaisessa vaiheessa. Riittävä ruiskutusmäärä ja optimaalinen ruiskutustekniikka ovat tärkeitä hyvän vaikutuksen saavuttamiseksi. Kasveja ruiskutetaan tasaisesti tippumisasteeseen, kauttaaltaan kosteiksi, ei kuitenkaan tippuvan märäksi. Ruiskutuksessa kostutetaan lehtien ala- ja yläpinnat. Korkeissa lämpötiloissa ja voimakkaassa auringonpaisteessa ruiskutus on syytä siirtää iltaan erityisesti kasvihuoneoloissa.

#### **Tomaatti, paprikat ja munakoiso kasvihuoneessa**

Härmän (*Leveillula taurica* ja *Oidium lycopersicum*), harmaahomeen (*Botryotinia fuckeliana* syn. *Botrytis*) ja pahkahomeen (*Sclerotinia sclerotiorum*) torjuntaan. Ruiskutetaan ensimmäisten oireiden ilmaannuttua ja käsittely uusitaan tarvittaessa 7–14 vrk:n kuluttua. Valmistetta käytetään korkeintaan kolme kertaa samalle kasvustolle.

Käyttöväkevyys on 0,1 % (100 g/100 l vettä). Suositeltu veden käyttömäärä on vähintään 80 litraa/1000 m<sup>2</sup> ja maksimissaan 150 l/ha.

#### **Kasvihuonekurkku, avomaankurkku ja kesäkurpitsa kasvihuoneessa**

Härmän (*Sphaerotheca fuliginea*) ja lehtilaikkutautien (*Cladosporum* spp.) torjuntaan. Ruiskutetaan ensimmäisten oireiden ilmaannuttua ja käsittely uusitaan tarvittaessa 14 vrk:n kuluttua. Valmistetta käytetään korkeintaan kaksi kertaa samalle kasvustolle.

Käyttöväkevyys on 0,1 % (100 g/100 l vettä). Veden käyttömäärä on maksimissaan 150 litraa/1000 m<sup>2</sup>.

#### **Salaattikasvit, pinaatti ja yrtit kasvihuoneessa ja avomaalla**

*Botryotinia fuckeliana* -harmaahomeen ja *Sclerotinia sclerotiorum* -pahkahomeen sekä *Rhizoctonia solani* -taimipoltteen torjuntaan. Ruiskutetaan välittömästi ensimmäisten oireiden ilmaannuttua. Käsittelyn voi tehdä noin viikko istutuksen jälkeen. Mikäli olosuhteet ovat taudeille suotuisat, käsittelyn voi uusia 7-14 päivän kuluttua kaikilla muilla lajeilla paitsi

vuonankaalilla. Muilla salaattikasveilla, pinaatilla ja yrteillä valmistetta käytetään korkeintaan kaksi kertaa viljelyn aikana.  
Käyttömäärä on 150 g/1000 m<sup>2</sup> 30–50 litraan vettä 1000 m<sup>2</sup>:lle.

#### **Retiisit ja retikat kasvihuoneessa**

*Botryotinia fuckeliana* -harmaahomeen ja *Rhizoctonia solani* -taimipolteen torjuntaan. Valmiste ruiskutetaan välittömästi ensimmäisten oireiden ilmaannuttua. Valmistetta käytetään korkeintaan kerran viljelyn aikana.  
Käyttömäärä on 150 g/1000 m<sup>2</sup> 40–150 litraan vettä 1000 m<sup>2</sup>:lle.

#### **Palsternakka, juuripersilja, punajuuri, mukulaselleri, piparjuuri, retiisit ja retikat sekä kaurajuuri**

Porkkananlehtilaikun, porkkanan taimipolteen (*Alternaria*) ja härmän torjuntaan. Valmiste vaikuttaa myös pahkahomeeseen. Käsittely tehdään ensimmäisten tautioireiden ilmaantuessa. Tarvittaessa tehdään toinen ruiskutus 14 vrk:n kuluttua. Valmistetta käytetään korkeintaan kaksi kertaa kasvukauden aikana. Varastotauteja varten ensimmäisen käsittelyn ajankohta on heinä-elokuussa.  
Käyttömäärä on 0,75 kg/ha 200–400 litraan vettä.

#### **Valkosipuli, salottisipuli ja varhaissipulit (pillisipuli ja vastaavat lajikkeet)**

*Alternaria*-sienten, harmaahomeen ja sipulinpahkamädän torjuntaan. Ruiskutetaan ensimmäisten oireiden ilmaannuttua ja käsittely uusitaan tarvittaessa 10–14 vrk:n kuluttua. Valmistetta käytetään korkeintaan kaksi kertaa kasvukauden aikana.  
Käyttömäärä on 1,0 kg/ha 300–500 litraan vettä.

#### **Parsakaali, kukkakaali, valkokaali, ruusukaali, punakaali, savoiijinkaali, suippokaali ja lehtikaali**

Kalkkihomeen (*Albugo candida*), *Alternaria*-sienten ja kaalinlehtilaikun (*Mycosphaerella brassicicola*) torjuntaan. Teho on paras ennaltaehkäisevänä käsittelynä, mutta valmiste ruiskutetaan viimeistään ensimmäisten oireiden ilmaannuttua ja käsittely uusitaan tarvittaessa 3-4 viikon kuluttua. Valmistetta käytetään korkeintaan kaksi kertaa kasvukauden aikana.  
Käyttömäärä on 1 kg/ha 200–1000 litraan vettä.

#### **Kuivattavat pavut**

Harmaahomeen ja *Ascochyta*-sienten torjuntaan. Ruiskutetaan kukinnan alkaessa tai ensimmäisten oireiden ilmaannuttua. Toinen ruiskutus tehdään viimeistään palkojen muodostuessa. Valmistetta käytetään korkeintaan kaksi kertaa kasvukauden aikana kuivattavilla pavuilla.  
Käyttömäärä on 1 kg/ha 200–400 litraan vettä.

#### **Tilli avomaalla**

Kalkkihomeen (*Albugo candida*) ja *Sclerotinia* spp. -pahkahomeen torjuntaan. Ruiskutetaan ensimmäisten oireiden ilmaannuttua. Käsittely uusitaan tarvittaessa aikaisintaan 10 vrk:n kuluttua. Korkeintaan kaksi käsittelyä kasvukaudessa samaan kasvustoon.  
Käyttömäärä on 1,5 kg/ha 400–1000 litraan vettä.

#### **Peruna**

Vain lehtipolteen (*Alternaria solanii* ja *Alternaria alternata*) torjuntaan. Valmiste vaikuttaa myös varsikuolioon (*Sclerotinia sclerotiorum*) ja harmaahomeeseen (*Botrytis cinerea*). Torjunta tulee aloittaa tautisaastunnon alkamisvaiheessa, kun ensimmäiset taudinoireet tulevat näkyviin tai kun on riski tautisaastunnalle. Käsittelyt aloitetaan yhdessä ensimmäisten perunaruttotorjuntajien kanssa ennen kuin kasvusto sulkeutuu. Seuraava ruiskutus tehdään 5-10 vrk:n kuluttua. Käyttömäärä on 0,25 kg/ha 150–400 litraan vettä.

Valmistetta käytetään korkeintaan kolme kertaa kasvukautta kohti. Korkeintaan puolet lehtipoltekäsittelyistä tulee koostua Signum-valmisteesta. Korkeintaan kaksi käsittelyä voidaan tehdä peräkkäisinä ruiskutuksina. Muut sopivat valmisteet ruiskutusohjelmaan ovat mankotsebivalmisteet ja Revus Top. Strobiluriinejä sisältäviä valmisteita (esim. Amistar, Consento tai Mirador) eivät sovi vuorotteluun. Käyttöohjeessa ilmoitettuja käyttömääriä ja -kertoja ei saa ylittää.

#### **Mansikka kasvihuoneessa**

Harmaahomeen (*Botrytis cinerea*), härmän (*Podosphaera aphanis*), mustalaikun (*Colletotrichum aculatum*), ruskomädän (*Gnomonia fructicola*) ja rengaslaikun (*Mycosphaerella fragariae*) torjuntaan. Ensimmäinen käsittely voidaan tehdä, kun kukkavarret lähtevät venymään (BBCH 56–58). Lehtilaikkutautien torjunnassa käsittely tehdään kasvin alkuvaiheessa (BBCH 13). Käsittely uusitaan tarvittaessa 7 vrk:n kuluttua. Valmistetta voi käyttää korkeintaan kaksi kertaa vuodessa. Käyttömäärä on 180 g/1000 m<sup>2</sup> 40–200 litraan vettä 1000 m<sup>2</sup>:lle.

#### **Pensasmustikka**

Harmaahomeen (*Botrytis cinerea*) torjuntaan kukinnan alkaessa ja kolme päivää ennen sadonkorjuuta. Vaikuttaa myös lehtilaikkutauteihin (*Colletotrichum* spp.). Suositellaan ruiskutettavaksi ennaltaehkäisevästi ja käsittely uusitaan tarvittaessa 7 vrk:n kuluttua. Valmistetta ruiskutetaan korkeintaan kaksi kertaa kasvukaudessa. Käyttömäärä on 1,5 kg/ha 400–1000 litraan vettä.

#### **Herukat (puna-, musta-, viher- ja valkoherukka)**

Harmaahomeen (*Botrytis cinerea*), härmän (*Sphaerotheca mors-uvae*), varistetaudin (*Drepanopeziza ribis*) ja herukanvillaruosteen (*Cronartium ribicola*) torjuntaan. Ruiskutus tehdään kukinnan alkaessa ja viimeistään kolme päivää ennen sadonkorjuuta. Käsittely uusitaan tarvittaessa 10 vrk:n kuluttua. Valmistetta voi käyttää korkeintaan kaksi kertaa kasvukaudessa. Käyttömäärä on 1,5 kg/ha 200–1000 litraan vettä.

#### **Vadelmat ja vatukat (vadelma, karhunvatukka, loganinmarja, boysenmarja, lakka, japaninvadelma, mesimarja ja mesivadelma) avomaalla, muovitunnelissa tai kasvihuoneessa**

Harmaahomeen (*Botrytis cinerea*), vadelman ruosteen (*Phragmidium rubi-idaei*) ja versotaudin (*Didymella applanata*) torjuntaan. Ruiskutus tehdään harmaahomeen torjunnassa kukinnan alkaessa ja viimeistään kolme päivää ennen sadonkorjuuta. Käsittely uusitaan tarvittaessa 10–14 vrk:n kuluttua. Valmistetta voi käyttää korkeintaan kaksi kertaa kasvukaudessa. Käyttömäärä on 0,75–1,5 kg/ha 500–1000 litraan vettä.

#### **Koristekasvit kasvihuoneessa ja avomaalla**

Seuraavien tautien torjuntaan: *Alternaria* spp., *Sclerotinia* spp.-pahkahome, *Rhizoctonia solani*, lehtilaikkutaudit ja harmaahome. Taimistoilla valmistetta voidaan käyttää myös seuraavien tautien torjuntaan: likusterin laikkutauti (*Colletotrichum gloeosporiodes*) tai Ribes-lajeilla varistetauti (*Drepanopeziza ribis*). Ruiskutetaan, kun taudin ensimmäiset oireet ilmaantuvat. Käsittely uusitaan 12–14 päivän kuluttua, jos tautipaine jatkuu. Kasvihuoneessa ja harmaahomeen torjuntaan avomaalla käyttöväkevyys on 0,1-0,15 % eli 100–150 g valmistetta/100 l vettä 1000 m<sup>2</sup>:lle. Käyttömäärä taimistokasveilla likusterille ja Ribes-lajeille on 1,0–1,5 kg/ha vähintään 200 litraan vettä. Käytetään koristekasveilla korkeintaan kaksi kertaa peräkkäin ja korkeintaan kaksi kertaa vuodessa samalla kasvustolla.

**Käyttörajoitus resistenssin välttämiseksi**

Valmistetta käytetään kasvista riippuen korkeintaan 1-3 kertaa kasvukautta kohti samassa kasvustossa. Nämä käsittelyt voidaan tehdä peräkkäisinä ruiskutuksina, jotka muodostavat yhden torjuntablokin. Resistenssin välttämiseksi korkeintaan puolet käsittelyistä tulee koostua Signum-valmisteesta, jonka toinen tehoaine on resistenssiherkstä strobiluriini-ryhmästä.

Käyttöohjeessa ilmoitettuja käyttömääriä ja -kertoja ei saa ylittää.

**Fytotoksisuus**

Kaikki testatut kasvit ovat kestäneet valmistetta suositellulla käyttöväkevyydellä hyvin. Valmistetta on testattu ainakin seuraavilla suvuilla: *Rhododendron*, *Rosa*, *Taxus*, *Viola* ja *Aster*. Kasvien suuresta laji- ja lajikevalikoimasta johtuen on kuitenkin syytä tehdä koe ennen varsinaista käyttöä kasvilajin kestävyuden toteamiseksi kyseenomaisessa kasvuvaiheessa.

**Yhteiskäyttö hyötyeliöiden kanssa**

*Macrolophus*-petoluteen toukalle Signum on kohtalaisen haitallinen, jälkivaikutusta ei ole. Signum on haitaton *Euseius finlandicus* ja *Typhlodromus pyri* -petopunkeille. Valmiste on lievästi haitallinen *Aphidius rhopalosiphi* -kiilukaiselle.

Valmiste luokitellaan sallituilla käyttömäärillä ja pitoisuuksilla käytettynä mehiläisille ja kimalaisille vaarattomaksi. Valmistetta voidaan käyttää tankkisekoituksena *Steinernema feltiae* -sukkulamadon kanssa.

**Ruiskutusnesteen valmistus**

Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vettä, Signum lisätään sekoituspumppun käydessä. Tämän jälkeen lisätään loput vedestä. Ruiskutusneste käytetään välittömästi. Signumin tehoaineet ovat vakaita pH-alueella 4-9.

Valmistetta voidaan käyttää tankkiseoksena esimerkiksi Caudit-, Delan WG-, Fastac 50-, Rovral WG-, Scala-, perunaruttovalmisteiden kanssa sekä YaraVita Solatrelin kanssa. Valmistetyyppien lisäyksessä tankkiseokseen suositellaan seuraamaan seuraavaa järjestystä: WP, WG mankotsebivalmisteet, Signum, SC, SE, EC ja SL.

**Huomautukset:**

Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, lisätään Signum sekoituspumppun käydessä ja sitten loput vedestä. Ruiskutusneste käytetään välittömästi.

Valmistetta voidaan käyttää tankkiseoksena Caudit-, Delan WDG-, Scala- ja Fastac 50 -valmisteiden kanssa.

Suojattava jäätymiseltä.

**Luvanhaltija:** BASF Oy

**Rekisterinumero:** 2796

**Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:** xxx

**Nettopaino tai -tilavuus:** 000

**Vähäiset käyttötarkoitukset (minor-use) -hyväksymisen haltijat:**

Kauppapuutarhaliitto ry, Larin Kyöstin tie 6, 00650 Helsinki  
Yhteyshenkilö: Hanna Mononen (kasvihuonetuotanto)  
puh. 09 7288 2113, s-posti: etunimi.sukunimi@kauppapuutarhaliitto.fi

Taimistoviljelijät ry, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki

Yhteyshenkilö: Jyri Uimonen  
puh. 09 5841 6550, s-posti: taimistoviljelijat@puutarhaliitto.fi

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry, Viljatie 4 C, 00700 Helsinki  
Yhteyshenkilö: Tuija Tanska  
puh. 050 5685 916, s-posti: etunimi.sukunimi@puutarhaliitto.fi

MTK ry, Simonkatu 6, 00100 Helsinki  
Yhteyshenkilö: Mika Virtanen  
puh. 020 413 2468, s-posti: etunimi.sukunimi@mtk.fi

Minor use -hyväksyminen on voimassa 31.8.2018 saakka.

Elintarviketurvallisuusvirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 19.11.2008.