

Myyntipäällyksen teksti

STABILAN 750 SL**Kasvunsäade****Vaara**

Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller.

Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.

Myrkyllistä joutuessaan iholle. Giftigt vid hudkontakt.

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID

HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine: klormekvattikloridi 750 g/l

Valmistetyyppi: SL

Käyttäjärhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Viljojen ja sementimotein kasvun säätelyyn ja lakoutumisen estämiseen sekä käyttöohjeessa mainittujen koristekasvien kasvun säätelyyn kasvihuoneissa.

Käytön rajoitukset: Syysviljat on ruiskutettava ennen kesäkuun alkua ja kevätiljat ennen heinäkuun alkua (yleensä 25.6. mennessä). Sementimotein korsia ei saa käyttää eläinten rehuksi. Viljan olkia ei saa käyttää lypsykarjan rehuksi. Syöttö lihakarjalle on lopetettava viikkoa ennen teurastusta.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on lisäksi käytettävä kasvojen suojainta.

Käyttöohje: VILJAT JA TIMOTEI

Viljat voidaan ruiskuttaa joko yhdessä rikkakasvihävitteen kanssa ennen viljan korrenkasvun alkua tai yksinään viimeistään viljan 1-solmuasteella. Paras laonesto-vaikutus saadaan ruiskutettaessa 1-solmuasteella. Rukiin ja kauran käsittelyssä ruiskutusnesteseen voidaan lisätä kiinnitettä 0,3 - 0,5 l/ha, mikäli valmistetta ei ruiskuteta seoksena jonkun muun aineen kanssa.

Timotein siemenviljelykset ruiskutetaan timotein pensomisasteella, noin 25 cm:n korkuisena.

<u>Käyttökohde</u>	<u>Käyttömäärä l/ha</u>
syysvehnä	1,0 - 2,0
kevätsvehnä	0,3 - 1,0
ruis	1,5 - 2,0
kaura	1,0 - 1,5
timotein siemenviljelykset	2,0 - 2,6

Vesimäärä 200 - 400 l/ha.

Huomautukset

Vaarallista muille viljelykasveille. Heikossa kasvukunnossa olevaa tai poudanaralla maalla kasvavaa viljaa ei saa ruiskuttaa.

KORISTEKASVIEN KASVUNSÄÄTELY KASVIHUONEISSA

Käyttö ruiskutteenä:

Käyttökohde	Käsittelykerrat, ensimmäisen käsittelyn ajankohta x)	Käyttömäärä (ml/100 l vettä)
<i>Abutilon x hybridum</i> (vaahtera-aulio)	1 kerta, kasvien ollessa n. 10 cm	95 - 160
<i>Aphelandra squarrosa</i> (leopoldinkukka)	1 kerta, kasvin ollessa 10–15 cm	240 - 300
<i>Begonia x cheimantha</i> (annansilmä)	1 kerta, versonnan alettua latvonnan jälkeen	95 - 120
<i>Begonia x hiemalis</i>	2-4 kertaa lajikkeesta ja vuodenajasta	95 - 120

(pauliinabegonia)	riippuen, 1. kerta heti lyhytpäiväkäsittelyn alkaessa	
<i>Begonia tuberhybrida</i> (mukulabegonia)	1 kerta taimien ollessa n. 10 cm	95 - 120
<i>Calceolaria x 2 kerta</i> , <i>speciosa</i> (iso tohvelikukka)	1. kerta kukkanuppujen ollessa 1-2 mm	55
<i>Cataranthus roseus</i> (punatalvio)	1 kerta, latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	120 - 160
<i>Clerodendrum thomsoriae</i> (kohtalonpensas)	1-2 kertaa, 1. kerta heti latvonnan jälkeen	120 - 185
<i>Euphorbia pulcherrima</i> (joulutähti)	8-10 kertaa, 1. kerta latvomattomille taimille viikko istutuksen jälkeen, latvotuille 2 viikkoa latvonnan jälkeen. Kasvun ollessa voimakas uusintakäsittelyt 2 kertaa viikossa. Viimeinen pituuskasvun hillitsemiseksi tehty käsittely ennen 15.10.	240
- " -	Suojuslehtien alkaessa värittyä, "tähten" laadun parantamiseksi	120 - 160
<i>Fuchsia x hybridum</i> (verenpisara)	2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 3-4 cm	185 - 240
<i>Hibiscus spp.</i> (kiinanruusu)	2 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 3-4 cm	95 - 160
<i>Pachystachus lutea</i> (kultakäpy)	3-4 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	95 - 120
<i>Pelargonium hortorum</i> (kotipielikki)	1-2 kertaa, 1. kerta 2 viikkoa latvonnan jälkeen	160 - 185
<i>Pelargonium peltatum</i> (riippapielikki)	1-2 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 10-12 cm	160 - 185
<i>Pelargonium domesticum</i> (jalopielikki)	2-3 kertaa, 1. kerta latvomattomille taimille	240 - 300
<i>Rosa</i> (äitienpäiväruusu)	2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 3-4 cm, käsittelyväli 8 vrk	300
<i>Sinningia speciosa</i> (suppilokukka)	2-3 kertaa, 1. kerta lehtien ollessa 10-12 cm pitkiä	120 - 185
<i>Dianthus caryophyllus</i> (neilikka)	2 kertaa, 1. kerta lyhytpäiväkäsittelyn alkaessa, uusinta 2 viikkoa myöhemmin	500 - 600
<i>Chrysanthemum frutescens</i> (margareeta)	2-3 kertaa, 1. kerta latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	240 - 300

x) Uusintakäsittely, ellei toisin ole mainittu, 2-3 viikon välein

Käyttö kasteluna:

Käyttökohde	1. kerta x)	Käyttömäärä
-------------	-------------	-------------

		(ml/100 l vettä)
Achimenes x hybrida (torpankukka)	Taimien ollessa 5-8 cm	185 - 300
Aphelandra squarrosa (leopoldinkukka)	Taimien ollessa 10 - 15 cm	370 - 450
Pelargonium x hortorum (kotipielikki)	2 viikkoa latvonnan jälkeen	300
Euphorbia fulgens (koralliköynnös)	1. kerta versojen ollessa 20–30 cm	120 - 185
Chrysanthemum frutescens (margareeta)	Latvonnan jälkeen versojen ollessa 1-2 cm	600 - 900

x) Uusintakäsittely, ellei toisin ole mainittu, 2-3 viikon välein

Huomautukset

Käsittelyn jälkeen voi esiintyä ohimenevää kloroosia. Suuremmat käyttömäärät voivat aiheuttaa vioituksia. Vastaistutettuja neilikantaimia saa käsitellä aikaisintaan 10 päivän kuluttua latvomisesta ja pitkän päivän käsittelyssä olevia aikaisintaan 3 viikon kuluttua valotuksen aloittamisesta.

Luvanhaltija: xxx

Valmistaja: xxx

Edustaja Suomessa: xxx

Rekisterinumero: 2860

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 0000

Netttilavuus: 0000

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 20.12.2005.