

## Myyntipäällyksen teksti

**RAMBO 360 S**

Rikkakasvien torjunta-aine

**Tehoaine:** glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyliamiinisulana)

**Valmistetyyppi:** SL

**Käyttötarkoitus:**

Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta, metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

**Varoitukset:**

Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

**Käytön rajoitukset:**

Varoaika rehuohra-, rehukaura- sekä rypsi- ja rapsiviljelyksillä 10 vrk. Käyttö leipäviljoilla ja siemenviljoilla ennen puintia on kielletty. Marjaviljelysten ruiskuttaminen on kielletty. Sivelymenetelmää ei saa käyttää vadelma- ja mesimarjaviljelyksillä eikä rönsyjen poistamiseen mansikkaviljelyksiltä. Marjastus ja sienestys on kielletty lehvästöruskualueella käsittelystä vuoden loppuun. Käsiteltyjä viljan olkia ei saa käyttää eläinten rehuksi.

**Ympäristöhaittojen ehkäisy:**

Vesiliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa käyttää eikä levitysvälineitä puhdistaa 15 metriä lähempänä vesistöjä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta. Ruiskutettaessa on varmistauduttava, ettei torjunta-ainetta kulkeudu vesiin tuulen mukana. Ylijäänyttä ruiskutusnestettä ei saa päästää vesiin. Ylijäänyt, käyttökelvoton torjunta-aine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle.

**Suojaimet:**

Valmistetta käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää suojapukua, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

**Käyttökohteet:**

- 1) viljelysmaat ennen kevätkylvöä tai -istutusta tai sadonkorjuun jälkeen
- 2) viljapellot ennen suorakylvöä tai sen jälkeen
- 3) juolavehnan torjunta rehuohra-, rehukaura-, rypsi- ja rapsiviljelyksiltä ennen puintia
- 4) viljapellot puinnin yhteydessä
- 5) kynnettävät nurmet
- 6) muokkaamaton kesanto
- 7) hedelmätarhat
- 8) viljelemättömät alueet

9) sivelykäsittelynä kasvukauden aikana viljelysmailta, monivuotisten kasvien alustoilta ja riviväleistä, viljelemättömiltä alueilta sekä metsänviljelyssä.

10) metsänuudistusaloilla vesakontorjuntaan lehvästörüiskutuksena, kantokäsittelynä ja taskutuksena sekä ruohovartisten kasvien torjuntaan.

11) hukkakauran torjuntaan muokkaamattomalla kesannolla ja viljelemättömillä alueilla.

### **Yleiset käyttöohjeet:**

Valmiste vaikuttaa kasveihin ainoastaan vihreiden lehtien ja varsien kautta, joten rikkakasvien tulee olla hyvässä kasvussa, vihreitä ja riittävän kehittyneitä. Juola-vehnässä tulee olla vähintään 3-4 vihreää lehteä (10-15 cm korkeaa). Monivuotiset rikkayrtit torjutaan juuri ennen niiden kukintaa tai sen aikana, kuitenkin aina ennen rikkakasvien tuleentumista. Hukkakaura torjutaan viimeistään sen tullessa röyhylle.

Voimakas kuivuus ennen ruiskutusta tai sade ruiskutuksen jälkeen voivat heikentää valmisteen tehoa. Valmisteen teho alkaa näkyä 10-14 vrk:n kuluttua ruiskutuksesta.

Maata ei saa muokata ennen ruiskutusta. Ruiskutuksen jälkeen maa voidaan kyntää tai muokata vasta, kun rikkakasvien väri on muuttunut punavioletiksi tai keltaiseksi, tavallisesti noin 2-4 viikon kuluttua ruiskutuksesta.

Valmiste ei tehoa jäätyneessä kasvustossa. Halla ei kuitenkaan heikennä tehoa, jos ruiskutus tehdään sulaneeseen kasvustoon.

Eri käyttökohteita koskevat käyttöohjeet ovat myyntipakkauksen taskussa erillisessä liitteessä.

### **Huomautukset:**

Vaarallista kaikille viljelykasveille ja lehtipuille sekä havupuille ennen vuosikasvainten puutumista. Ruiskutuksissa on varottava tuuliajtoa ja sivelykäsittelyssä valmisteen joutumista kosketuksiin viljelykasvin kanssa (esim. valmistetta tippuu viljelykasvin päälle, sitä kulkeutuu viljelykasviin traktorin pyöristä tai jalkineista, sivelylaite koskettaa viljelykasvia). Valmistetta ei saa päästää puiden lehdille tai oksiin, sillä se vioittaa puuta myös lehdettömänä aikana. Lehtipuiden, ennen muuta haavan ja poppelin juuret voivat kasvaa yhteen viereisen, samaa lajia olevan puun kanssa. Sen vuoksi kantokäsittelyssä ja taskutuksessa on se vaara, että viereiset puut vioittuvat tai kuolevat.

Ruiskutus viljoilla puinnin yhteydessä on sallittu ainoastaan tarkoitukseen kehitetyillä laitteilla ja laitteiden käyttöohjeita noudattaen. Laitteiden kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Puimurin alle asennettavista, samoin kuin sivelykäsittelyyn soveltuvista laitteista saa tietoja maahantuoilta.

Vesakoiden lehvästörüiskutusta suunniteltaessa, ruiskutusalueetta merkittäessä ja ruiskutettaessa on noudatettava maa- ja metsätalousministeriön päätöstä (306/1986) torjunta-aineiden lentolevityksestä.

Valmiste voi syövyttää galvanoitua metallia. Metallin syöpyessä syntyy herkästi syttyvää kaasua. Galvanoidussa astiassa tai säiliössä ei valmistetta saa sekoittaa, varastoida eikä siitä ruiskuttaa.

Alin varastoisilämpötila -15 °C.

**Sekoitettavuus:**

Valmistetta ei saa sekoittaa muihin torjunta-aineisiin. Käyttökohteissa, joissa kiinniteaineen käyttö on mahdollista, sitä voidaan lisätä 0,5 l/100-200 l vettä/ha. Kantokäsittelyssä voidaan käyttää väri- ja jäätymisenestoainetta.

**Rekisteröinnin haltija:** xxx

**Valmistaja ja pakkaaja:** xxx

**Edustaja Suomessa:** xxx

**Rekisterinumero:** 1902

**Valmistuserä:** 000

**Nettobilavuus:** 000

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 5.4.2001.

Myyntipäällyksen liite  
Säilytettävä myyntipakkauksen taskussa

## **RAMBO 360 S**

### **KÄYTTÖOHJE**

Lue aina ensin yleiset käyttöohjeet, käytön rajoitukset ja huomautukset valmisteen myyntipäällystekstistä ennen kuin ryhdyt käyttämään valmistetta.

## **VILJELYSMAAT, HEDELMÄTARHAT JA VILJELEMÄTTÖMÄT ALUEET**

### **Viljapellot ja muut viljelysmaat:**

#### **Ennen kevätkylvöä tai –istutusta**

Ruiskutus tehdään, kun juolavehnässä on vähintään 3 lehteä

Käyttömäärä 3 l/ha +0,5 l/ha kiinnitettä + 100–200 l/ha vettä

Jos hävitettävänä on huonosti talvehtinut syysvilja ja/tai vastataimettuneet rikkayrtit, ruiskutetaan lohko kasvun alettua, kun kasvupisteet ovat vihreät.

Käyttömäärä 1,5 l/ha +0,5 l/ha kiinnitettä + 100–200 l/ha vettä

Kevätkäsittelyn teho juolavehnään ei ole yhtä hyvä kuin syysruiskutuksen. Mikäli käsitelty lohko muokataan, tulee väli ruiskutukseen olla vähintään 7 päivää. Jos lohkolla on pääasiassa vain yksivuotisia rikkakasveja, voidaan muokkaus tehdä 2 päivän kuluttua.

#### **Sadonkorjuun jälkeen:**

Käsittelyaika: elo-syyskuu.

Rikkakasveja peittävät oljet ja muut puintijätteet on ensin poistettava tai levitettävä peltoon, jotta rikkakasvien, etenkin juolavehnan versot saavat valoa ja ruiskutettaessa torjunta-ainetta. Olkien silppuamista voidaan suositella ainoastaan puitaessa lyhytkortista viljaa aikaisin elokuussa (vrt. yleiset käyttöohjeet).

Juolavehnä: käyttömäärä: 4 l/ha + 100–200 l/ha vettä , tai vaihtoehtoisesti  
3 l/ha + 0,5 l/ha kiinnitettä + 100–200 l/ha vettä.

Vaihtoehtoinen käyttömäärä voidaan valita, kun ruiskutusolot ovat hyvät ja juolavehää on vähän tai kohtalaisesti.

Rikkayrtit: (esim. leskenlehti, peltovalvatti, pelto-ohdake, peltopähkämö)  
käyttömäärä: 6-8 l/ha + 100–200 l/ha vettä.

### **Viljapellot ennen suorakylvöä tai sen jälkeen:**

Ruiskutus tehdään ennen suorakylvöä tai viimeistään 2 vrk kylvön jälkeen. Oljet ja muut kasvijätteet on poistettava ennen käsittelyä. Ruiskutettaessa viljan kylvön jälkeen on viljan vioittumisen välttämiseksi tärkeää, että siemenet ovat maan peitossa.

Juolavehnä ja muut monivuotiset rikkakasvit

Käyttömäärä 3 l/ha + 0,5 l/ha kiinnitettä + 100–200 l/ha vettä.

Vastataimettuneet rikkakasvit

Käyttömäärä 1,5 l/ha + 0,5 l/ha kiinnitettä + 100–200 l/ha vettä.

**Juolavehnän torjunta rehuohra-, rehukaura-, rypsi- ja rapsiviljelyksiltä ennen puintia:**

Käsittely tehdään vähintään 10 päivää ennen puintia. Ruiskutushetkellä viljan jyvien kosteuden on oltava alle 30 %. Käsittelyä ei saa tehdä siemenviljalle.

Käyttömäärä: 2-3 l/ha + 0,5 l/ha kiinnitettä + 100-200 l/ha vettä.

Alinta käyttömäärää suositellaan vain vähäisen juolavehnäsaastunnan torjuntaan hyvissä ruiskutusoloissa ja hyväkuntoisella kasvinsuojeluruiskulla ruiskutettaessa. Vesimäärä on tällöin 150 l/ha.

**Juolavehnän torjunta viljoilla puinnin yhteydessä:**

Puimurin alle asennettavalla laitteella ruiskutus voidaan tehdä välittömästi viljan leikkuun jälkeen.

Tyydyttävän tuloksen saavuttaminen edellyttää, että rikkakasveissa on leikkuun jälkeen vihreitä, terveitä osia, joista aine pääsee kasviin.

Jotta juolavehnäkasvustoon saataisiin riittävästi torjunta-ainetta, on puidessa pyrittävä mahdollisimman korkeaan sänkeen. Menetelmää ei pidä käyttää puitaessa lakoontunutta viljaa.

Sade ruiskutuksen jälkeen sekä voimakas kuivuus ruiskutusaikana voivat heikentää tehoa.

Käyttö- ja vesimäärä: 3 l/ha sekoitettuna 100-200 litraan puhdasta vettä.

**Kynnettävät nurmet:**

Käsittelyaika: heinä-syyskuu.

Viimeisen sadonkorjuun tai laiduntamisen lopetuksen jälkeen juolavehnän ja heinän on annettava kasvaa kunnes niissä on 3-4 vihreää lehteä (vrt. yleiset käyttöohjeet).

Juolavehnä: käyttömäärä: 4 l/ha + 100-200 l/ha vettä tai vaihtoehtoisesti 3 l/ha + 0,5 l/ha kiinnitettä + 200 l/ha vettä.

Vaihtoehtoinen käyttömäärä voidaan valita, kun ruiskutusolot ovat hyvät ja juolavehnää on vähän tai kohtalaisesti.

Rikkayrtit: käyttömäärä: 6-8 l/ha + 100-200 l/ha vettä

**Muokkaamaton kesanto ja viljelemättömät alueet:**

Käsittelyaika:

juolavehnä ja muut monivuotiset rikkakasvit: heinä-elokuu.

hukkakaura: viimeistään hukkakauran tullessa röyhylle.

Kesantoa ei saa muokata ennen käsittelyä. Syksyllä kynnetty maa voidaan tasausäestää varhain keväällä ja ruiskuttaa aikaisintaan heinäkuun loppupuolella.

Torjunta-ajankohta tulee valita valtarikkakasvien kehitysasteen perusteella (vrt. yleiset käyttöohjeet).

Juolavehnä: käyttömäärä: 4 l/ha + 100-200 l/ha vettä, tai vaihtoehtoisesti  
3 l/ha + 0.5 l/ha kiinnitettä + 100-200 l/ha vettä.

Rikkayrtit: käyttömäärä: 6-8 l/ha + 100-200 l/ha vettä.

Hukkakaura: käyttömäärä: kesannossa ja viljelemättömillä alueilla  
2-3 l/ha + 100-200 l/ha vettä. Ruiskutusnesteeseen lisätään kiinnitettä  
0,5 l/200 l vettä/ha.

### **Hedelmätarhat:**

Torjunta-ajankohta tulee valita valtarikkakasvien kehitysasteen perusteella (vrt. yleiset käyttöohjeet). Hedelmäpuiden alustat ja rivivälit voidaan ruiskuttaa aikaisintaan 4 vuoden kuluttua puiden istutuksesta. Rikkakasveja peittävä aines on poistettava ennen käsittelyä. Runko- ja tyvivesat on poistettava vähintään viikkoa ennen käsittelyä.

Juolavehnä: käyttömäärä 4 l/ha + 100–200 l/ha vettä.

Rikkayrtit: käyttömäärä: 6-8 l/ha + 100–200 l/ha vettä.

## **SIVELYKÄSITTELY KASVUKAUDEN AIKANA**

### **Käyttökohteet:**

Viljelysmaat (sokerijuurikas-, lanttu-, porkkana-, punajuurikas- ja mansikkaviljelykset, monivuotisten kasvien alustat, laitumet, peltojen metsitysosalat ja heinittyvät istutusosalat) ja viljelemättömät alueet.

### **Käytön rajoitukset:**

Sivelymenetelmää ei saa käyttää vadelma- ja mesimarjaviljelyksillä eikä rönsyjen poistamiseen mansikkaviljelyksiltä.

Rikkakasvien sivelykäsitteily on paikallaan silloin, kun muut torjuntatoimenpiteet ovat epäonnistuneet tai niitä ei ole pystytty tekemään. Menetelmä soveltuu parhaiten korkeiden rikkakasvien, kuten savikan, rypsin, ohdakkeen ja valvatin torjuntaan. Käsitteily tehdään joko traktoriin liitetyllä tai käsikäyttöisellä erikoislaitteella, jolla käyttöväkyyteen laimennettua liuosta sivellään viljelykasveja vähintään 15 cm korkeampien rikkakasvien lehdille. Ajonopeus traktorilla on korkeintaan 5 km/h.

Valmiste tehoaa vain niihin rikkakasveihin, joita laite koskettaa. Käsitteilyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä valmiste tuhoaa kaikki viljelykasvit, joiden kanssa se pääsee kosketuksiin.

### **Viljelykasvustoja korkeammat rikkakasvit ja monivuotisen kasvien alustat ja rivivälit:**

Käyttöväkyytyys: 30-50 % laimennettuna veteen.

Sivelylaitetta kuljetetaan viljelykasvustoa korkeampien rikkakasvien yläpuolella siten, että se koskettaa rikkakasveja. Rikkakasvien tulee olla käsittelyn aikana vähintään 15 cm korkeampia kuin viljelykasvit. Tiheässä rikkakasvustossa laitteella voidaan ajaa

edestakaisin ja käsittely voidaan uusia tarpeen mukaan kasvukauden aikana. Mansikkaviljelyksillä emotaimet tuhoutuvat, jos valmistetta joutuu rönsyille. Puiden taimien ympäriltä rikkakasvusto sivellään tarkoitukseen sopivalla sivelylaitteella ulospäin suuntautuvien vedoin varoen kosketusta taimiin.

**Viljelemättömät alueet:**

Käyttöväkevyys: 30-50 % laimennettuna veteen.  
Sivelykäsittelyllä voidaan hävittää ruohomainen kasvillisuus joutoalueilta kuten esim. tiealueilta, pientareilta ja rakenteiden ympäriltä. Rikkakasvien on oltava vähintään 10 cm korkeita.

**METSÄNVILJELY****Metsänuudistusalat:**

Käytetään lehtipuuvesakoiden ja ruohovartisten rikkakasvien torjuntaan. Ruiskutusta suunniteltaessa, ruiskutusaluetta merkittäessä ja tehtäessä on noudatettava voimassa olevia säädöksiä (ks. kohta huomautukset valmisteen myyntipäällyksen tekstistä).

**Lehvästörüiskutus:**

Käsittelyaika: heinä-syyskuu.  
Käyttömäärä: 2-3 l/ha + 100-200 l/ha vettä.  
Ruiskutus tehdään havupuutaimikoissa vuosikasvainten puuduttua yleensä elokuussa tai ennen taimien istutusta heinäkuun alusta alkaen.

**Kantokäsittely:**

Käsittelyaika: kaikkina vuoden aikoina heti kaadon yhteydessä, paitsi ei keväällä ns. mahlan aikana.  
Käyttöväkevyys: 10-15 %.  
Laimennos tehdään vedellä, ja siihen lisätään väri- ja jäätyminenestoainetta. Suurinta käyttöväkevyyttä suositellaan reheväkasvuisilla mailla.

**Taskutus:**

Käsittelyaika: puiden runkojen ollessa sulia, paitsi mahlan virtauksen aikana.  
Käyttöväkevyys: 30-50 % laimennettuna veteen.  
Suurinta käyttöväkevyyttä käytetään kylmänä vuoden aikana.

**Ruohovartisten rikkakasvien torjunta:**

Ruiskutus tehdään yleensä ennen istutusta tehon kannalta sopivana ajankohtana (ks. yleiset käyttöohjeet). Jos ruiskutus tehdään istutuksen jälkeen, taimet on suojattava. Ruiskutuksen asemasta voidaan käyttää myös sivelykäsittelyä (ks. kohta sivelykäsittely kasvukauden aikana).

Käyttömäärä: kokoalakäsittelynä 4-6 l/ha + 100-200 l/ha vettä.  
Kaistalekäsittelyssä ainemenekki on noin puolet ja laikkukäsittelyssä noin 1/4 kokoalakäsittelyn ainemenekistä.

Istutusvuotta seuraavana vuonna ja sen jälkeen ruiskutus tehdään havupuun taimia suojaamatta niiden vuosikasvainten puuduttua.  
Käsittelyaika: elo-syyskuu.

Käyttömäärä: 3 l/ha + 100-200 l/ha vettä.